

Rezepte zum Herstellen von Milchaustauscher für Heim- und Wildtiere

Milchaustauscher für Heimtiere

	Chinchilla	Degu	Frettchen	Kaninchen	Meer- schweinchen	Ratte
Mengenangaben für 100 g verabreichbaren Milchaustauscher	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
Kätzchen- und Welpenmilch (Pulver)	20	15	23	36	18	26
Lactose (Milchzucker, Pulver)	1	3	3		2	2
Öl, z.B. Maiskeimöl	4	11				2
Quark, Magerstufe					18	
Trinkwasser, handwarm	75	71	74	64	62	70

Milchaustauscher für Wildtiere

	Eich- hörnchen	Fleder- maus I*	Fleder- maus II*	Igel	Reh	Waschbär
Mengenangaben für 100 g verabreichbaren Milchaustauscher	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
Kätzchen- und Welpenmilch (Pulver)	25	19	32	45	24	12
Kondensmilch, 7,5% Fett	22					
Lactose (Milchzucker, Pulver)		4	3		4	4
Öl, z.B. Maiskeimöl		2	9	8		
Quark, Magerstufe						15
Trinkwasser, handwarm	53	75	56	47	72	69

* I 1.-4. Lebenswoche, II 5.-12. Lebenswoche

Fütterungshinweis:

Durchschnittliche Tagesmenge pro Heim- und Wildtier bei Alleinfütterung nach Bedarf (bei Zufütterung um ca. 50% reduzieren oder nach Bedarf).

Aufnahmemenge pro Fütterung bei Heimtieren (Nager) und kleinen Wildtieren in der ersten Lebenswoche ca. 1 ml (1 g Körpergewichtszunahme/Welpe nach Fütterung), anschließend Steigerung nach Bedarf (bis zur Sättigung des Welpens), bei Frettchen und größeren Wildtieren wie Reh und Waschbär entsprechend wie Hundewelpen ähnlichen Körpergewichts.

Anzahl der Fütterungen pro Tag in der ersten Lebenswoche engmaschig (alle 2 Stunden), ab Alter von über einer Woche mögliche Ausdehnung der Fütterungsintervalle auf 4 bis 5 Stunden.