

Impfempfehlungen für Hunde und Katzen

Unsere Impfempfehlungen orientieren sich an den Empfehlungen der [Ständigen Impfkommision Vet.](#).

Grundsätze:

"Mehr Tiere impfen, das einzelne Tier aber weniger häufig!"

1. Die Impfung ist die wichtigste Maßnahme zur Verhinderung von Infektionskrankheiten.
2. Der jährliche Impftermin dient der Gesundheitskontrolle und -beratung. Er ist Grundlage für die Erstellung eines individuellen Impfprogrammes.
3. Eine vollständige Grundimmunisierung ist Voraussetzung für einen optimalen Schutz des Einzeltieres und beeinflusst den weiteren Impfplan.
4. Ein höchstmöglicher Durchimpfungsgrad (>70%) ist in einer Tierpopulation anzustreben, um Epidemien zu verhindern.
Der Durchimpfungsgrad wird in Deutschland auf 50% bei Hunden und auf 35% bei Katzen geschätzt.
5. Es wird unterschieden in Core-Komponenten (gegen Erreger, gegen die jedes Tier zu jeder Zeit geschützt sein muß) und Non-Core-Komponenten (Schutz individuell nach Gefährdungsgrad und epidemiologischer Situation anzupassen).
6. Parasiten beeinflussen das Immunsystem. Vor Impfungen ist daher eine Entwurmung durchzuführen und auf Ektoparasiten zu kontrollieren.

Impfungen für Hunde

Core: Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Leptospirose, Tollwut

Non-Core: Zwingerhusten (Parainfluenza), Bordetella, Borreliose, Babesiose, Herpes, Microsporum

Grundimmunisierung: Als Grundimmunisierung gelten alle Impfungen der ersten zwei Lebensjahre.

Alter	Impfung gegen
8 Wochen	Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Leptospirose, Zwingerhusten
12 Wochen	Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Leptospirose, Tollwut, Zwingerhusten
16 Wochen	Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Leptospirose, Tollwut, Zwingerhusten*
16 Monate	Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Leptospirose, Tollwut, Zwingerhusten

Ältere Tiere erhalten ihre Impfungen in den gleichen Abständen. Tiere über 12 Wochen erhalten eine zweimalige Impfung im Abstand von 3-4 Wochen und eine Wiederholung nach einem Jahr. Bei erhöhtem Infektionsdruck kann mit speziellen Impfstoffen ab einem Alter von 5 Wochen gegen Parvovirose geimpft werden.

Wiederholungsimpfungen: Alle Impfungen, die nach abgeschlossener Grundimmunisierung erfolgen.

Impfung gegen	Empfohlenes Impfschema
Tollwut	seit 20.12.2005 gelten die Angaben des Impfstoffherstellers, i. d. Regel 1-3 Jahre
Leptospirose	jährlich, in Endemiegebieten öfter
Parvovirose, Hepatitis, Staupe	Abstand von 1-3 Jahren möglich, Angaben des Impfstoffherstellers beachten
Zwingerhusten	jährlich
Bordetella	zum Zwingerhustenkomplex gehörend, als nasaler Impfstoff
Borreliose	Grundimmunisierung ab 12 Wochen möglich: 2x im Abstand von 3-5 Wochen, am besten im Frühjahr, erste Auffrischung nach 4-6 Monaten ("Herbstimpfung"), zweite Auffrischung nach 4-6 Monaten (Frühjahr des 2. Impfstoffjahres); Wiederholungsimpfungen jährlich vor der Zeckensaison
Babesiose	Es existiert ein Impfstoff (verfügbar z.B. in Frankreich und Schweiz), dieser ist aber z.Z. in Deutschland nicht zugelassen.
Herpes	Impfung der tragenden Hündin 7-10 Tage nach Decktermin und 1-2 Wochen vor Wurftermin
Microsporium	Impfung prophylaktisch oder therapeutisch möglich, 2x im Abstand von 14 Tagen, jährliche Wiederholung.

Impfungen für Katzen

Core: Katzenschnupfen (Rhino- und Calicivirus), Katzenseuche (=Panleukopenie), Tollwut (Freigänger)

Non-Core: Felines Leukosevirus, FIP, Chlamydien, Microsporum, Bordetella

Grundimmunisierung: Als Grundimmunisierung gelten alle Impfungen der ersten zwei Lebensjahre.

Alter	Impfung gegen
8 Wochen	Katzenschnupfen, Katzenseuche, (FeLV, Ch)
12 Wochen	Katzenschnupfen, Katzenseuche, Tollwut, (FeLV, Ch)
16 Wochen	Katzenschnupfen, Katzenseuche, Tollwut, (FeLV, Ch)*
16 Monate	Katzenschnupfen, Katzenseuche, Tollwut, (FeLV, Ch)

Ältere Tiere erhalten ihre Impfungen in den gleichen Abständen. Tiere über 12 Wochen erhalten eine zweimalige Impfung im Abstand von 3-4 Wochen und eine Wiederholung nach einem Jahr.

Wiederholungsimpfungen: Alle Impfungen, die nach abgeschlossener Grundimmunisierung erfolgen.

Impfung gegen	Empfohlenes Impfschema
Tollwut	seit 20.12.2005 gelten die Angaben des Impfstoffherstellers, i. d. Regel 1-3 Jahre
Katzenschnupfen, Chlamydien, FeLV	jährlich
Katzenseuche	Abstand von 2-3 Jahren möglich, Angaben des Impfstoffherstellers beachten
FIP	Impfung ab 16 Wochen, zweimalige intranasale Impfung im Abstand von 3 Wochen, Wiederholungen jährlich
Microsporum	s. Hund
Bordetella	am Katzenschnupfenkomplex beteiligt, zweimalige intranasale Impfung ab einem Alter von 5 Wochen, Wiederholungen jährlich

* Die Impfung im Alter von 16 Wochen geht über die gesetzlichen Anforderungen hinaus, ist aber aus immunologischer Sicht sinnvoll und wird z.B. vom VDH empfohlen.

weitere Informationen:

[Prof. Dr. Hans Wunderlich, Jagdgebrauchshundeverband JGHV](#)
[VDH](#)